

NOVE TEHNOLOGIJE I SORTE LESKE

Проф. Др Зорана Кесеровић


**Модул 11 – „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СОРТЕ ОРАХА И ЛЕШНИКА-
БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ“, ПАРАЋИН, 17. 09. 2026. GODINE**

Леска



Леска

Према подацима ФАО из 2022. године, површине под леском у Републици Србији износе 7.115 ха, што Србију ставља на пето место у Европи. Водећа земља по површинама у Европи је Италија (84.430 ха), следе Шпанија (12.660 ха) и Хрватска (8.240 ха). Према Попису из 2023. године, под леском у Републици Србији се налази 8.960 ха., а према подацима СЗС за 2025. годину под леском се налази 8.849 ха.






Леска

Република Србија није искористила агроеколошке услове за производњу лешника те заостаје за Турском, која произведе преко 765.000 тона и водећа је у свету, и Италијом, која је са 98.670 тона водећа у Европи. Велике количине лешника произведу и Азербејџан (72.105 тона), САД (70.310 тона), **док се Република Србија, са производњом од 9.328 тона, налази на 11. месту (ФАО, 2022.).**

У Европи, по производњи леске, предњачи Италија (98.670 тона), а следе је Француска (9.960 тона) и Пољска (9.500 тона), **док се Република Србија, са 9.328 тона, налази на четвртом месту. Према подацима СЗС у 2025 години је произведено 8.628 тона.** Када је у питању принос по ха, на првом месту је Грчка (2,6 тона/ха), затим САД (2,6 тона/ха), Кина са (2,1 тона/ха). У Европи, по производњи лешника, на првом месту се налази Грчка (2,6 тона/ха), затим Пољска (1,7 тона/ха), Француска (1,4 тона/ха), **док је Република Србија (1,3 тоне/ха) на десетом месту у свету и четвртом у Европи. По подацима СЗС за 2025 годину принос по хектару је био око 1 тону.**

Proizvedene količine lešnika u Srbiji u periodu od 2014. do 2023. godine





IZVOZ LEŠNIKA IZ TURSKE

Zemlje EU			Zemlje koje nisu u EU		
ZEMLJA	KOLIČINA (Kg)	VREDNOST(\$)	ZEMLJA	KOLIČINA (Kg)	VREDNOST(\$)
Italija	59.096.655	576.704.091	Švajcarska	9.145.419	77.147.363
Nemačka	57.826.616	538.357.995	Rusija	5.658.540	52.450.723
Francuska	22.289.452	192.888.520	Ukraina	3.827.463	32.943.985
Austria	10.556.312	88.780.347	Norveška	1.157.985	10.047.686
Belgija	8.835.487	73.777.429	Srbija	825.172	8.205.020
Ostale zemlje	35.128.348	320.391.596	Ostale zemlje	1.467.929	15.111.851
UKUPNO	193.832.870	1.790.899.976	UKUPNO	22.082.508	195.906.627


**UKUPAN IZVOZ LEŠNIKA IZ TURSKE U TOKU 2015 GODINE IZNOSI
2.827.000.000 DOLARA**

Tabela 11. Povoljnost okruga projektnog područja za gajenje leske

OKRUZI	Povoljnost gajenja (m N.V.)				
	Nepovoljno	Delimično	Povoljno	Delimično	Nepovoljno
Severnobački – 79-141 m			79-141		
Severnobanatski – 54-109 m			54-109		
Zapadnobački – 71-121 m			71-121		
Južnobački – 51-540 m			51-540		
Srednjebanatski – 47-123 m			47-123		
Južnobanatski – 53-625 m			53-625		
Sremski – 61-529 m			61-529		
Mačvanski – 63-1269 m			63-700	700-1000	1000-1269
Kolubarski – 35-1336 m			35-700	700-1000	1000-1336
Podunavski – 41-289 m			41-289		
Pomoravski – 88-1292 m			88-700	700 -1000	1000-1292

Karta povoljnosti gajenja **leske** za teritoriju projektnog područja Severna i deo Zapadne i Centralne Srbije

Karta povoljnosti gajenja



1. INTRODUKOVANE VRSTE

BRAON MRAMORASTA STENICA (*Halyomorpha halys* Stall)

Poreklom iz Kine, Koreje, Japana ili područja klimatski bliski Evropi





BRAON MRAMORASTA STENICA



POJAVA BAKTERIOZA







SUŠENJE STABALA









Podizanje zasada i ekonomska opravdanost gajenja leske-žbunste forme

- Ukupni troškovi podizanja zasada iznose od 5.500 – 7.500 eur (podrivanje, oranje, tanjiranje, sadnice, sadnja, navodnjavanje, ograđivanje, rad)
- Troškovi održavanja od 500 eur u prvoj godini do 1.500 eur u 9. godini.
- Komercijalna rodnost nastupa u 5-6 godini
- Puna rodnost nastupa u 9-10 godini
- U punom rodu , a prema konzervativnim propačunima , 1 ha donosi oko 2.500 kg (u ljusci)
- Eksploatacioni vek žbuna leske je od 35-40 godina
- Prednost žbuna je mogućnost zanavljanja zasada
- Cena lešnika se kreće od 6,5-8,5 eur u poslednjih 12 godina sa znatnim skokovima u pojedinim godinama. Cena lešnika u ljusci kreće se od 2,7-3,5 eur
- Otkup se vrši u ljusci
- Prvu kategoriju čini oko 80 % lešnika na plantaži
- Pravilnim održavanjem zasada, sakupljanjem i manipulacijom lešnika, odezbeđujemo visoke prinose i kvalitet proizvoda

- **Red: Betulales (breza)**
- **Familija: Betulaceae (breza)**
- **Rod: Corylus L. (leska)**

- U okviru roda *Corylus* se nalazi 15 vrsta i varijeteta od kojih je za nas najznačajnija *Corylus avellana* (obična, evropska leska).
- Obična leska je češće žbunasta voćka, retko stablašica.

Vrste leske

- ***Corylus avellana* L. (obična, evropska leska)**
- ***Corylus maxima* Mill. (carigradska leska)**
- ***Corylus tibetica* Bat. (tibetanska leska)**
- ***Corylus ferox* Wall. (himalajska leska)**
- ***Corylus colurna* L. (turska leska)**
 - - var. *chinensis* Franch
 - - var. *jacquemontii* Dcne. (var. *lacera* Wall)
 - - var. *glandulifera* (syn. *C. colurna arborescens*)
- ***Corylus heterophylla* Fisch. (sibirska leska)**
 - - var. *sutchinensis* Franch
 - - var. *yunnanensis* Franch
- ***Corylus sieboldiana* Bl. (mandžurijska leska)**
 - - var. *mandshurica* Maksim.
- ***Corylus cornuta* March /C. Rostrata Ait./ (kalifornijska leska)**
 - - var. *californica* Rose
- ***Corylus americana* Marsh. (američka leska)**

Frühe Nottingham



Webb's Preisnuss



Cosford



Englische Zellernuss



Neue Riesennuss



Wunder v. Bollweiler



Lange Zellernuss



Lambert Filbert



Daviana



Minna's Zellernuss



Hallesche Riesennuss



Römische Zellernuss







- List leske je prost.
- Pojedine vrste i varijeteti imaju crvenu boja listova koja je posebno izražena u proleće.



C. Avelana

Purpurea Maxima

C. colurna



Bluthasel (*Corylus maxima* 'Purpurea')



Lambertshasel (*Corylus maxima*)

MORFOLOGIJA LESKE

- - KOREN
- -DEBLO
- -KRUNA
- -PUPOLJCI-vegetativni, cvetni i mešoviti
- -PLOD-ORAŠICA (KUPOLE, LJUSKE I JEZGRE)

CVETANJE LESKE

- -PRISUTNA DIHOGAMIJA
- -PRETEŽNO PROTOANDRIJA
- -PROTOGINIJA IZUZETNO RETKA
- -HOMOGAMIJA-Tonda di Giffoni i tonda Gentile Romana

- Pupoljci leske mogu biti vegetativni, cvetni i mešoviti.
- Iz vegetativnih nastaju mladari sa listovima.
- Mešoviti pupoljci se nalaze duž letorasta i na njihovom vrhu. Iz ovih pupoljaka se naredne godine razvijaju mladari sa listovima i ženskim cvetovima.
- Cvetni pupoljci formiraju rese odnosno mušku cvast. Cvetaju obično u februaru kada se izdužuju do dužine od 10-12 cm.



Reproduktivni organi (muški i ženski cvetovi) nalaze se na grančicama iz prethodne vegetacije na kojima se formiraju rodni pupoljci!

- Muški cvetovi su grupisani u rese. Njihovom cvetanju prethodi izduživanje rese.
- Kod većine sorti sazrevanje muškog i ženskog gametofita nije istovremeno. **Kod leske je izražena protandrija (ranije resanje) kao i kod oraha.**
- Sorte leske ranog resanja poneke godine resaju od novembra do januara odnosno prethodne, umesto sledeće godine i ne oprašne ni jednu sortu.
- Kada pre zri ženski gametofit od resanja ta pojava se naziva protaginija. Protaginija je izuzetno retka kod leske, znatno ređa nego kod oraha, gde je takođe retka.
- Ako oba gametofita zru približno istovremeno, ta pojava se zove homogamija (sorte: Tonda di Giffoni, Tonda Gentile Romana itd.).

FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA

MUŠKI CVET




ŽENSKI CVET




Reproduktivni organi (muški i ženski cvetovi) nalaze se na grančicama iz prethodne vegetacije na kojima se formiraju rodni pupoljci!



Muški cvetovi su obično iznad ženskih!



- **Leska se obično oprašuje nekoliko meseci pre oplodnje.** Oprašivanje se obično vrši u februaru, a oplodnja u maju. Oprašivanju prethodi zrenje polena i izduživanje crvenkastih žigova tučka na kojima će polen klijati i ući u pupoljak leske.
- **Leska je praktično autosterilna.** Postoji gen autosterilnosti i plod kod samooplodnje obično abortira kad je prečnika do 5 mm. Isto tako postoje, kao i kod trešnje, intersterilne grupe sorti. Smatra se da se sorte Daviana i Cosford ne oplođuju (intersterilne su).



Resanje

Cvetanje ženskih cvetova



- **Plod leske je orašica.** Nalazi se na vrhu letorasta. Sastoji se od spoljnog omotača (kupula), koji često pokriva ljusku u kojoj se nalazi seme. Obično se nalazi više njih u grupi, a kod racemoznih sorti i 15-20 u grupi.
- Pri zrenju ljuska postaje svetla ili tamno braon boje. Debljina ljuske je važna osobina.






Ennis



Tonda Gentile delle Langhe





- 1 – Eliptičan (dužina je manja od širine; ravan na polovima)
- 2 – Okrugao (dužina je približa širini)
- 3 – Koničan
- 4 – Jajast (dužina je veća od širine; jajast oblik)
- 5 – Kratko cilindričan (blago izdužen)
- 6 – Dugo cilindričan (izdužen lešnik)



Srem



Tonda Bianca



Enis



Contorta



Mečija leska



Lunga di Spagna



legenda:


D - Debljina

Š - Širina


H - Visina

- Randman jezgre lešnika je oko 45%
- Jezgra lešnika ima visok sadržaj ulja (od 50 do 80%) i 14 do 20% proteina.
- Ukupnih šećera ima 3-6%

Horizontalni raspored korenovog sistema leske



Vertikalni raspored korenovog sistema leske



PODIZANJE ZASADA -STABLAŠICE

- Savremen uzgoj ne može da se zamisli bez primene mehanizacije,a to je moguće samo ukoliko se leksa gaji u vidu stabljice
- Važno je pravilno podići zasad, jer se radi o dugogodišnjem uzgoju
- Prilikom podizanja treba voditi računa dali ima dovoljno i pravilno raspoređenih oprašivača
- Obično se sadi 1 ili 2 glavne sorte i 2 ili 3 oprašivača, postoji više načina rasporeda sorti.
- Tamo gde nije poznat način kalemljenja leske,uništavaju se izdanci,uglavnom mehanički,što predstavlja dodatni trošak u proizvodnji.
- Prelaskom kalemljenja leske na mečiju lesku ovaj problem je potpuno rešen.
- Navodnjavanje se kod leske gajene u vidu žbuna vrši kap po kap,a leska gajena u vidu stabljice navodnjava se primenom mikrorasprskivača.

PODIZANJE ZASADA

-kalemljena leska-


- Savremen uzgoj leske ne može da se zamisli bez primene **mehanizacije**, a to je moguće samo ukoliko se leksa gaji u vidu stablašice
- Važno je pravilno podići zasad, jer se radi o **dugogodišnjem uzgoju**
- Prilikom podizanja treba voditi računa da li ima dovoljno i pravilno raspoređenih **oprašivača**
- Obično se sadi 1 ili 2 glavne sorte i 2 ili 3 oprašivača, postoji više načina **rasporeda sorti**.
- **Tamo gde nije poznat način kalemljenja leske, uništavaju se izdanci, uglavnom mehanički, što predstavlja dodatni trošak u proizvodnji. Kalemljenjem sorti leske na mečiju lesku ovaj problem je potpuno rešen.**
- Navodnjavanje se kod leske gajene u vidu žbuna vrši kap po kap, a leska gajena u vidu stablašice navodnjava se primenom mikroraspoređivača

IZBOR TERENA

- Treba voditi računa da ne bude zatvorena dolina tj. mrazište
- Zatvoreni tereni nisu dobri ni zbog anemofilnog oprašivanja, već tereni koji su izloženi povetarcu
- Na zatvorenim terenima voćke su više izložene napadu parazita, u prvom redu gljiva
- Najpogodniji su blagi nagibi sa preko 800mm padavina godišnje, ravnomerno raspoređenih

PRIPREMA ZEMLJIŠTA I SADNJA

UZORKOVANJE



HEMIJSKA ANALIZA ZEMLJIŠTA

- ✓ Tekstura
- ✓ pH (6,8-7,3)
- ✓ Humus (min 3%)
- ✓ Makroelementi:
 - Azot (0,1-0,18%)
 - Fosfor (min. 15mg/100gr)
 - Kalijum (min. 25 mg/100gr)
- ✓ Kalcijum (max. 10%)

PLAN ĐUBRENJA

Osloniti se na stručnjake za pravilno tumačenje hemijske analize zemljišta radi planiranja odgovarajućeg đubriva

FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA- Klima



MRAZ: izbegavati oblasti sa kasnim mrazovima(April). Temperature malo ispod nule su veoma štetne u periodu Aprila



ZAHTEVI ZA NISKIM TEMPERATURAMA: Količina niskih temperatura izračunata na bazi Juta sistema: moraju biti u trajanju od 700 do 900 sati u toku zime



MAKSIMALNA TEMPERATURA: 40 °C

(kritična $T^{\circ} > 34^{\circ} \text{C}$)

MINIMALNA TEMPERATURA: oko -11 °C



VLAŽNOST VAZDUHA: Mart-Oktobar 60-70%



PADAVINE: OD 800-1000 mm/godišnje.



VETAR: Ne jači od 40 km/h i ne konstantno, posebno dok su biljke još mlade i u vreme cvetanja i oprašivanja

PRIPREMA ZEMLJIŠTA I SADNJA

MEHANIZOVANA

NEMA RAZMERA VANJA

NEMA KOPANJA RUPA



5-7 ha/dnevno

TRADICIONALNA

1 RAZMERAVANJE

2 KOPANJE RUPA

3 SADNJA



NADZEMNO NAVODNJAVANJE

SISTEM POSTAVLJEN NA ZEMLJI



PREDNOSTI

- Nema troškova naslona
- < vreme postavljanja sistema

MANE

- Suzbijanje korova u redu u prvim godinama
- Prepreka pri skupljanju plodova
- Gubitak vode evapotranspiracijom

PREDNOSTI

- Lakša obrada u redu
- Nema prepreka kod skupljanja plodova

MANE

- > troškovi
- > brzina postavljanja
- Gubitak vode evapotranspiracijom

SISTEM NA NASLONU



PROIZVODNJA– Navodnjavanje



Navodnjavanje kap po kap sa duplim kapajućim crevima



Kapajuće trake postavljene na krošnje



Dupla kapajuća creva




Rasprskivač




Kapljica(detelj)

PROIZVODNJA-Navodnjavanje

..u prvim godinama



..nakon 4.godine



PREDNOSTI



- Mogućnost korišćenja mehanizacije
- > iskorišćenost vode dovodi do boljeg razvoja biljke

MANE



- Premeštanje nakon 4 godine zbog veličine korena
- > problemi sa pucanjem vodova
- > investicija

RAZMACI SADNJE

- Rastojanje zavi od:
 - - bujnosti sorte
 - - podloge
 - - uzgojnog oblika i plodnosti zemljišta
- Razmaci sadnje :
 - Slabo bujne sorte 5x5; 4x4
 - Srednje bujne sorte 6x6; 5x5
 - Bujne sorte 7x7;6x6
 - **PREPORUKA 5,5-6,0 X 4,0-4,5**

RASTOJANJE 5X5 U TROUGAO



PRIPREMA ZEMLJIŠTA I SADNJA



Odluku o rasporedu i razmaku sadnje treba bazirati na bunosti sorte, plodnosti zemljišta, planiranju proširenja zasada



Primer: PLAN SADNJE

SORTA	FUNKCIJA	ZASTUPLJENOST
<i>Tonda di Giffoni</i>	Osnovna sorta	80%
<i>Tonda Gentile Romana</i>	Oprašivač	10%
<i>Nocchione</i>	Oprašivač	10%
RAZMAK SADNJE: 5 x 3 (667 kom./ha) ili 5 x 4 (500 kom./ha)		

..Od 12-14 godine se uklanja svaka druga biljka



Primer: Raspored sadnje



STABLAŠICE I ŽBUNASTE FORME LESKE



PROIZVODNJA-Đubrenje

Osnovni elementi na kojima se bazira đubrenje su: azot, fosfor i kalijum. Količina primene zavisi od više faktora, kao što su zemljište i sorta.

	ĐUBRENJE PRED SADNJU			ĐUBRENJE ZA RAST I RAZVOJ (od 2. do 4. godine)			ĐUBRENJE NA ROD (od 4. godine)		
	N	P	K	N	P	K	N	P	K
<i>Količina</i>	Zavisi od rezultata hemijska analize zemljišta			20-30 jedinica	5-10 jedinica	10-20 jedinica	80-100 jedinica	25-40 jedinica	60-80 jedinica
<i>Vreme</i>	Pred sadnju i u sadnji			Jesen: PK đubriva sa min.količinom azota Vegetacija: ostatak N đubriva u dva navrata			2/3 PK đubriva u jesen+min. N 1/3 PK đubriva u vegetaciji+ ostatak N		
Napomena:	Lokalizovana upotreba đubriva radi smanjenja troškova								
	Uzeti u obzir i potrebu za mikroelementima								



Precizno sastaviti **PLAN ĐUBRENJA** zbog pravilnog unosa hranljivih elemenata za biljku!!!

REZIDBA LESKE

- Rezidbom se kod leske izbacuju grane koje deformišu oblik krune (ukrštene), bolesne i polomljene grane, zatim suviše rodne grane.
- Rodne grane se ostavljaju na razmaku 15-20 cm.
- Najrodnije su grane leske 15-25 cm dužine i 4-5 mm debljine.















UZGOJNI OBLICI



FORMIRANJE STABLA KOD ŽBUNASTI FORMI



RASTOJANJE 5X3 m











REZIDBA-UZGOJNI OBLICI

Stablašica



PREDNOSTI

- < stvaranje izdanaka
- Olakšano skupljanje
- Lakša kontrola izdanaka i korova, i priprema zemljišta za berbu

MANE

- Samo kod bujnih sorti
- U slučaju oštećenja gubi se cela biljka
- < rodnoš

Žbunasta vaza



PREDNOSTI

- < stvaranje izdanaka
- Olakšano skupljanje
- Lakša kontrola izdanaka i korova, i priprema zemljišta za berbu
- Lakše obnavljanje u slučaju loma

MANE

- Organizacija rezidbe

Žbun



PREDNOSTI


- Najlakša obnova u slučaju loma
- Organizacija rezidbe

MANE

- Problemi pri skupljanju plodova
- Teža kontrola izdanaka

ALAT ZA REZIDBU

- Alat mora biti sterilizovan kada se radi rezidba različitih polja, sorti, i ako se orezuje potencijalno inficirana biljka
- Alat se mora koristiti pažljivo vodeći računa o zaštiti na radu
- Grane ne smeju biti uklanjane lomljenjem nego sa orezivanjem čistim rezovima
- Ne ostavljati ostatke rezidbe u voćnjaku





PROIZVODNJA-Rezidba

Rezidba se obavlja **zimi ili u proleće**



PRAVILNO
UGAO 45°

POGREŠNO
VELIKI UGAO NISKO
VISOKO SUVIŠE



PRAVILNO
sečivo
oštrica
kuka

NEPRAVILNO
kuka
oštrica
sečivo



- Leska rađa na jednogodišnjim granama
- Grane veličine 5-6cm su skoro sterilne tj. Slabo rađaju
- Grane dužine 15-20cm su najbolje sa proizvodne tačke gledišta

PROIZVODNJA-Rezidba


Mehanizovana rezidba omogućava vertikalnu i horizontalnu rezidbu



**REZIDBA
VRHOVA**



**POSTRA
NA
REZIDBA**



PREDNOSTI

- < utrošeno vreme
- < ručnog rada
- > bolja osvetljenost krune
- > olakšana zaštita od bolesti i štetočina

MANE

- Ponovna rezidba radi uklanjanja izdanaka i suvih grana
- U eksperimentalnoj fazi

Podela sorti

na osnovu morfoloških karakteristika

- 1. Lambert sorte, koje imaju razvijene omotače i ne ispadaju iz njih lako. Ljuska ploda je ravna i nema vlaknastih materija kao u celskih lešnika. Tipični predstavnici su: Lambert beli i Lambert crvenolisni.
- 2. Celske (Zeller) sorte lešnika su sa otvorenim omotačem. Tu spada npr. Halški džin.
- 3. Lambert hibridi više liče na Lambert, a zreli plodovi najčešće ispadaju iz omotača.
- 4. Celski hibridi više liče na Celske sorte leske. Predstavnici ove grupe sorti su: Sivri, Daviana i dr.



Halški džin je tipičan predstavnik celskih sorti





VODEĆE SORTE

- Enis
- Tonda Gentile delle Langhe
- Tonda Gentile Romana
- Tonda di Giffoni

Ennis




- Stablo je bujno i vrlo rodno.
- Nije osetljiv prema niskim temperaturama
- Mada ne rađa u grozdovima zbog **vrlo krupnih plodova** i visokog procenta zametanja, spada **u rodne sorte**.
- Kasno cveta. Rese, a i ženski gametofiti su joj zreli najčešće u martu.
- Dobri oprašivači su: Lambert crvenolisni, Purpurea maxima, Contorta, Halški džin i dr.
- Ima lepe, vrlo krupne plodove (**prosek oko 4,7 g**), svetle, prugaste ljuske. **Lako se lomi.**
- Oblik ploda: Plod je loptastog do malo izduženog oblika!
- **Randman jezgre je visok, oko 49%**
- Sazreva kasno.
- Omotač ploda je umereno razvijen, a **plodovi pri trešenju lako ispadaju!**
- **Seme je obično slobodno od vlakana i nema potrebe za blanširanjem!**

**Omotač ploda je umereno razvijen, a
plodovi pri trešenju lako ispadaju!**



Ennis



ENNIS

Početak vegetacije – pozna

Bujnost – srednja

Rodnost – odlična

Otporna na mraz

Cvetanje – protandrično

Oprašivač – Barcelona, Willamet

Masa ploda – 3,5-4 g, Randman – 45-49%





Ennis



Ennis



FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA- Sortiment



TONDA GENTILE DELLE LANGHE (TGL)

KULTIVISANA U
PIJEMONTU

SREDNJE BUJNOSTI SA
POLUTVORENIM RASTOM GRANA

RANO OSLOBAĐANJE
POLENA

MALA
PRODUKTIVNOST

LAKO SE LJUŠTI POKOŽICA

RANDMAN: 44-48%



TONDA GENTILE ROMANA

STARA ITALIJANSKA
SORTA

SREDNJE-NISKA BUJNOST
POLUOTVORENI RAST GRANA

CVETANJE SREDINOM
SEZONE

PROIZVODNOST
SREDNJA DO
VISOKA

POKOŽICA SE TEŽE
LJUŠTI

RANDMAN: 44-48%

Tonda Gentile Romana

(sin.: *Tonda gentile di Viterbo*)


Okrugli lešnik od Rima



- Sorta je srednje do slabo bujno. Formira malo (srednje) izdanaka
- Rodna je sorta (i do 38 kg/stablo). Sklona je alternativnom rađanju.
- Cveta srednje pozno sa promenljivim karakteristikama (homogamija, protandrija ili protaginija). Drugi navod-Cveta skoro istovremeno (homogamo).
- **Dobar je oprašivač za većinu sorti**, a nju dobro oprašuju Nocchione, Daviana, Cosford i dr. Plodovi su srednji (oko 2,7 g).
- Često rađa u grozdovima. Prosečno ima 3,2 ploda u grozdu.
- **Ima mali omotač iz koga lešnik lako ispada.**
- Zri u avgustu. Randman jezgre je oko 45%
- **Slabo se odvaja semenjača nakon blanširanja!**



Tonde
Gentile
Rouca





Randman jezgre je oko 45%



Tonda Romana


Ima mali omotač iz koga lešnik lako ispada.



Tonda Romana



Tonda Romana



Tonda Gentile delle Langhe


(Sin.: *Tonda gentile
del Piemonte*)




- Italijanska sorta nastala selekcijom izu prirodne populacije.
- Srednje bujnost
- **Prinosi su srednji (u Srbiji niski prinosi).**
- **Rano resa i to puno ranije, više od mesec dana, tako da se resanje i zrenje ženskih gametofita, praktično nikada ne podudara.** U našoj zemlji ne rađa puno. Dobri oprašivači za ovu sortu su: Cosford, Halški džin i dr. **Ona je loš oprašivač za druge sorte.**
- Zri rano, kod nas u avgustu.
- Plodovi su sitni (2,3 g u proseku), loptoastog do loptasto spljoštenog oblika sa tankom ljuskom. U grupi ih ima prosečno po 2,9, a randman jezgre je oko 47%.
- **Jezgra je vrlo ukusna**
- Plodovi lako ispadaju iz omotača
- Srednja prekrivenost semenjačom ali **dobro se blanšira!**
- TGDŁ is highly valued by the chocolate industry because of its small round kernel, excellent blanching ability and excellent flavour .



Tonda Gentile delle Langhe





Tonda Gentile delle
Langhe

FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA-Sortiment



TONDA DI GIFFONI

KULTIVISANA U
OBLASTI SALERNO

BUJNA SA POLU-
USPRAVNIM RASTOM
GRANA

POLEN SE OSLOBAĐA VEOMA
RANO

VRLO RANA I
PRODUKTIVNA
SORTA

LAKO SE LJUŠTI POKOŽICA

RANDMAN: 44-47%



BARCELONA

RASPROSTRANJENA
U ZAPADNOJ EVROPI

VEOMA BUJNA

CVETANJE SREDINOM
PERIODA

VEOMA RODNA


SLABIJE SE LJUŠTI;
LAKO UŽEGNE

RANDMAN: 39-42%

Tonda di Giffoni



- Srednje bujna do bujna sorta.
- Rodna je sorta
- Ova sorta ima razvijeniji omotač od prethodne dve.
- Protandrična sorta. Resa rano. Dobri oprašivači za nju su: Nocchione, Tanda di Bianca, Barcelona i dr.
- Plodovi su sitni, tamno braon boje, više kolačasti (prosek 2,4 g). U grupi ima u proseku 2,8 plodova.
- Zri rano. Randman jezgre je oko 46%. Na jezgri, koja je često i rebrasta, ima puno vlakana pa se najčešće pre upotrebe prži.
- **Veoma dobro se blanšira!**





Tonda di Giffoni



Tonda di Giffoni



Tonda di Giffoni



Tonda Gentile delle Langhe

Ima karakteristične zelene pupoljke!
Rese su slično obojene (braon-zeleni)!

FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA- Sortiment



CAMPONICA

KULTIVISANA U
OBLASTI NAPULJA

BUJNA SORTA

RANO CVETANJE

PLOD
OVALNO-
OKRUGLAST

LAKO SE LJUŠTI
POKOŽICA

RANDMAN: 44-48%



NOCCHIONE

KULTIVISANA NA
SICILIJU

SREDNJA BUJNOST
OTVORENOG GRANANJA

IZUZETNO RANO
CVETANJE

OKRUGLAST
PLOD

POKOŽICA SE LAKO
LJUŠTI

RANDMAN: 35-38%

Nocchione

(*Sin.: Sicilijana*)



- Ova rodna sorta se puno gaji u Italiji. U Italiji (Sicilija) gaji se kao oprašivač za Tonda Gentile Romana.
- Srednje do slabo bujno stablo.
- Omotač ploda je mali.
- Dobar je oprašivač za mnoge sorte. Nju dobro oprašuju: Tonda Bianca, Mortarella, Daviana, Cosford i dr.
- Plodovi su vrlo lepi, srednje krupni (2,7 g). U grupi ih je po 3,4 u proseku. Zri srednje rano.
- Randman jezgre je vrlo nizak (oko 39%)




**Omotač ploda je nešto duži od
ploda ali plodovi lako
ispadaju.**



Nocchione



Nocchione



FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA- Sortiment

LUNGA DI SAN GIOVANNI



RAZVILA SE U OBLASTI
NAPULJA

BUJNA SA OTVORENIM
GRANANJEM

RANO CVETANJE

VEOMA
PRODUKTIVNA

IZDUŽEN PLOD
SREDNJE VELIČINE

RANDMAN: 49%

MERVEILLE DE BOLLWILLER (HALŠKI DŽIN)



NAJVIŠE SE PROIZVODI U
AUSTRALIJI I SAD

BUJNA SORTA

KASNO CVETANJE

PLOD OKRUGLASTO-
OVALAN

POKOŽICA SE LAKO
LJUŠTI

RANDMAN: 36-41%



Merveille de Bollwiller

Ima karakteristične tamno crvene do purpurne pupoljke!
Rese su slično obojene!

HALŠKI DŽIN

Nemačka sorta

Stablo – srednje bujno, uspravno

Cvetanje – protandrično

Oprašivači: Rimski, Cosford

Masa ploda – 3,5 g, Random

Plod lako ispada iz klapine



RIMSKI



Stablo – srednje bujno, dosta izdanaka

Cvetanje – protaginično, srednje kasno

Oprašivač: Cosford

Masa ploda – 3 g, Randcman – 44-45%

Plodovi ispadaju iz klapine



RIMSKI



ISTARSKI DUGI

Odabrana iz populacije lambertove leske – Istra

Stablo - srednje bujno do bujno, razgranato

Cvetanje – protandrično

Otporna na mraz

Oprašivači: Rimski, Halski džin, Ludolf

Masa ploda – 2,8 g, Randman – 43%

Pogodna za blanširanje

Klapina – duža od ploda






Cosford



- Stara Engleska sorta
- Bujna sorta. Stvaranje izdanaka slabo.
- Rađa redovno i obilno.
- Cveta izraženo portandrično
- Dobro oprašivači su: halski džin, lambert crvenolisni, Ennis, Contorta, Purpurea maxima i dr.
- Plodovi imaju izraženu crvenu ljusku a i jezgra je crvene boje ???
- Srednje je krupan (2,5 g). Rađa prosečno 1,5- 2 ploda u grozdu. Ima vrlo visok randman jezgre (54%) sa 68% ulja.
- **Omotač je srednje razvijen. Plod se slabo oslobađa iz omotača!**



Merville de Bollwiller

(Sin.: *Halls Giant*, *Geante de Halle*, *Wunder aus Bollwiller*, *Hallesche Rilsen*, a kod nas ***Halški džin***)



- Stablo je veoma bujno otporno na niske temperature.
- Veoma je rodna je ali kasnije prorodi (od 5 – 6 godine) jer je **bujna**.
- **Cveta relativno kasno i dobar je oprašivač za mnoge sorte. Ima mnogo resa koje su bogate polenom.**
- Dobri oprašivači za ovu sortu su: Contorta, Ennis, Cosford, Purpurea maxima, Lambert crvenolisni i dr.
- Ima lepe, krupne (oko 3,6 g), malo kupaste plodove. U grupi bude u proseku 2,5 ploda. Zri srednje kasno.
- **Randman jezgre je nizak, oko 37%**



Merveille de Bollwiller



Merveille de Bollwiller




ISTARSKI DUGI



MAŠINE ZA SKUPLJANJE LEŠNIKA



Čiščenje plodova pre sušenja



- 1-5-6-8 - Transportne trake
- 2 - Separator nečistoča
- 3-4 - Pranje
- 7 - Sušenje

Sušenje plodova



UDRUŽIVANJE

- REGIJA LACIO
 - Asocijacija voćara-
Assosfrutti
 - Pokriva 7.000 ha i
okupljaju 1600
proizvođača
 - Po proizvođaču oko
4,37 ha
 - Imaju još oko 2500
članova sa kojima
sarađuju
- REGIJA PIJEMONTE
 - Asocijacija
ASCOPIEMONTE
 - Pokrivaju 2.800 ha
 - Vodeća sorta Tonda
gentile dela Lange
 - Imaju plantaže u Čileu

PORODIČNI BIZNIS





Prinos sorti leske, prihod i dobit po ha (Kikinda, 2013-2014)

SORTA	GODINA	Prinos jezgre (kg/ha)	Troškovi (€/ha)	Prihod (€/ha)	Dobit (€/ha)
Tonda gentile romana	2013	1.920,38	2.135,46	10.677,31	8.541,85
	2014	581,27	963,74	4.818,72	3.854,00
Enis	2013	1.272,67	1.415,20	7.076,04	5.660,84
	2014	693,34	1.149,55	5.747,78	4.598,23
Ostale sorte	2013	561,68	624,59	3.122,00	2.497,41
	2014	394,87	654,69	3.273,47	2.618,78

Prosek za 2013/2014 po kilogramu je 5,56 €.

Prosek za 2014/2015 po kilogramu je 8,29 €. U prvim mesecima 2015 bila je 13,69 €.

Radman kod Tonde gentile romana (40,1-37,0 %), kod Enisa (43,2-42,2 %) i kod Istarskog . (41,3-40,5 %)

Prinos sorti leske, prihod i dobit po ha (Kikinda, 2015-2016)

SORTA	GODINA	Prinos jezgre (kg/ha)	Troškovi (€/ha)	Prihod (€/ha)	Dobit (€/ha)
Tonda gentile romana	2015	1.641,00	1.803,27	11.339,31	9.536,00
	2016	1.345,45	1.490,51	9.297,05	7.806,60
Enis	2015	1.148,45	1.803,45	7.935,79	6.132,34
	2016	861,84	1.490,51	5.955,31	4.464,80
Ostale sorte	2015	1.195,6	1.803,27	9.261,59	6.458,33
	2016	817,00	1.490,51	5.645,47	4.154,96

Prosek za 2015/2016 po kilogramu je 6,91€. Takva cena se očekuje i u 2016/2017.

Radman kod Tonde gentile romana (40,3-40,0 %), a kod Enisa (41,0-40,5 %).

Dobit sa 10 ha x 6.425,40 € = 64.254,05

Prinos sorti leske, prihod i dobit po ha (Kikinda, 2017)

SORTA	GODINA	Prinos jezgre (kg/ha)	Troškovi (€/ha)	Prihod (€/ha)	Dobit (€/ha)
Tonda gentile romana		1.546	1.712	10.686	8.974
Enis	2017	1.026	1.610	7.086	5.476
Istarski dugi		505	625	3.490	2.865

Prosek za 2015/2016 po kilogramu je **6,91€**. Takva cena se očekuje i u 2016/2017.
Radman kod Tonde gentile romana (40,3-40,0 %), a kod Enisa (41,0-40,5 %).

ŠTETOČINE LESKE-GRINJE I INSEKTI

- Leskina grinja-Phytoptus avellanae Nal.
- Zeleni bukvin krasac- agrilus viridis L.
- Leskin surlaš, leskin žižak-Curculio nucum L.
- Leskina stenica-zelena lisna stenica, leskina stenica
- Veliki problem u poslednje vreme pričinjava – Braon mramoraste stenica

GLJIVIČNI PARAZITI

- Pepelnica- *Phyllactinia guttata*
- Antraknoza, *gleosporium –piggotia coryli*
- Rak- *Cytospora corylicola*
- Trulež korena. Mednjača- *Armillaria mellea*

Istarski dugi



- U Srbiji je vodeća sorta. Najviše se gaji u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji
- Bujan i **rodan sorta**. **Daje dosta izdanaka.**
- Cveta rano, protandrično.?
- Za nju su dobri oprašivači: Tonda Gentile Romana, Daviana
- Rađa u grozdovima (prosečno 4- 5 plodova)
- Plod je lep, duguljast (oko 3,4 g). Randman jezgre je oko 46%
- **Ima relativno razvijen omotač iz koga dosta teško ispadaju plodovi.**
- Sazreva relativno rano (krajem avgusta).

SPOJ LEPOG, ZDRAVOG I KORISNOG

